DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES ATTIDÆ

par E. Simon.

Macopaeus (1) **spinosus** sp. nov. — ♀. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax luteus, linea submarginali fusca exillima cinctus, regione oculorum nigerrima, antice albo-nitido postice violaceo-micanti pilosa et setis albis paucis longissimis conspersa. Abdomen longum, cylindraceum, in medio leviter depressum, pallide luteum et albo-argenteo-pubescens, in parte basali vittis fuscis binis, latis et leviter incurvis, in parte altera vitta lata transversa maculaque apicali minore emarginata nigricantibus, supra ornatum. Chelæ, partes oris, sternum, pedesque pallide lutea, femoribus tibiisque apice leviter olivaceis. Plaga genitalis magna, fusca, plana et subrotunda. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

Portia (Brettus) russata sp. nov. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax lævis, fusco-rufescens, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra, pilis fulvis, utrinque in declivitate, sensim dilutioribus, vestitus et vitta media parum expressa albidiore notatus. Pili oculorum brevi, albidi. Clypeus latus, in medio fere glaber, utrinque vitta obliqua albido-pilosa discretus. Abdomen nigrum, supra fulvo-rufulo pubescens, antice vittis binis, postice arcubus transversis punctisque albido-pilosis notatum, subtus atrum, obscure cinereo-pubescens. Pedes obscure fulvi, fusco-annulati, pilis albis rufulisque ornati, femore tibiaque 1i paris subtus longe nigro-fimbriatis. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

Lagnus Kochi sp. nov. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica in medio dilutiore, parte cephalica pilis pronis obscure rufis, ad marginem frontalem longioribus, vestita, thoracica parcius luteo-cinereo pilosa. Pili oculorum coccinei. Clypeus angustus et glaber. Abdomen oblongum, supra atrum, fulvo-cinereo rufuloque pubescens, subtus dilutius et albido-sericeo-pilosum. Chelæ nigræ, glabræ, leviter rugutæ, breves et latæ, extus valde convexæ et geniculatæ, margine superiore sulci dentibus trinis, 1° majore, margine inferiore dentibus subæquis 5 munitis. Partes oris nigricantes. Sternum fulvum, antice leviter infuscatum.

(1) **Macopaeus** nov. gen. A *Pindaso* E. Sim. differt area oculorum dorsalium circiter æque longa ac lata, oculis intermediis magnis reliquis oculis vix minoribus, tibiis 1i paris aculeis inferioribus longis et validis 4-4, dimidium apicalem articuli tantum occupantibus, munitis. — Typus *M. spinosus* E. Sim.

Pedes longi, fulvi, femoribus, tibiis metatarsisque anticis utrinque late infuscatis, posticis confuse annulatis. Pedes-maxillares longi et graciles, pallide lutei, longissime albo-hirsuti; tibia tereti patella longiore; tarso tibia saltem æquilongo, leviter ovato sed acuminato, aculeis fuscis trinis extus armato. Plaga genitalis nitida, in medio depressa, fulvo-olivacea, utrinque nigra. — Australia : Cook-Town.

Titanattus pegaseus sp. nov. — ♂. Long. 4,7 mill. — Cephalothorax fusco-piceus, parte cephalica dilutiore et laete rufula, utrinque, prope oculos, late nigra, supra albo in lateribus fulvo-pubescens. Pili oculorum fulvo-aurantiaci. Clypeus altissimus, pilis crassis niveis, vittas transversas duas designantibus, ornatus. Abdomen oblongum, pallide testaceum, albo-pubescens et tenuiter fusco-clathratum, vitta longitudinali fulva, acute lanceolata et utrinque vitta marginali nigricanti, intus 2 vel 3 dentata, ornatum, subtus atrum, obscure testaceo-marginatum. Sternum fusco-rufescens. Chelæ nigræ, nitidæ, longæ et parallelæ, intus depressæ et obtuse marginatæ. Pedes fulvo-testacei, antici rufescenti-tincti, femoribus ad apicem fusco-annulatis, tibiis ad basin atque ad apicem metatarsisque ad basin nigricanti-annulatis, et tibiis posticis nigro-sublineatis. Pedes-maxillares lutei, apice infuscati, crasse albo-pilosi; tibia patella angustiore et paulo breviore, extus apophysi subbasilari divaricata, longissime nigro-penicillata armata ;tarso oblongo; bulbo subrotundo, convexo, intus stylo crasso marginato. — Reg. Amazonica : Sao Paulo de Olivença (de Mathan).

T. Juduliani sp. nov. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax nigellus, subtilissime coriaceus, crasse flavido-albido pubescens atque, in parte thoracica vitta media albidius pilosa ornatus. Pili oculorum obscure rufuli. Clypeus crasse et longe albido-luteo barbatus. Abdomen ovatum, supra fuscum testaceo-variatum, et area media longitudinali dilutiore valde laciniosa notatum, crebre albido-pubescens, subtus obscure testaceum. Chelæ nigro-nitidæ, subtilissime striatæ, margine superiore sulci dentibus quatuor sat validis et subcontiguis denteque ultimo minore, inferiore dentibus quatuor fere similibus, denteque anteriore minutissimo armatis. Sternum nigrum parce albo-pilosum. Pedes fulvi, late fusco-plagiati et subannulati, aculeis longis ordinariis armati. Plaga genitalis fulva, nitida, trapezoidalis, utrinque area subrotunda striata notata. — Resp. Argentina (Judulian).

Anaurus (1) **flavimanus** sp. nov. — ♀. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax obscure fusco-piceus, antice utrinque late niger,

(1) Anaurus nov. gen. A *Titanatto* imprimis differt chelarum margine inferiore dentibus septem æquis et contiguis armato. — Typus *A. flavimanus* E. Sim.

fulvo-pubescens sed prope oculos rufulo-pilosus. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem vitta angusta niveo-pilosa ornatus. Abdomen atrum (fere omnino depile). Chelæ fuscæ, læves, antice deplanatæ, ad marginem exteriorem anguloso-ampliatæ et mucronatæ, margine superiore sulci dentibus 5-6, medianis majoribus, inferiore dentibus contiguis septem instructis. Partes oris, sternum coxæque fusco-picea. Pedes lutei, valde nigro-annulati, aculeis ordinariis armati. Plaga genitalis magna, nigro-nitida, simplex, semicircularis et convexa. — Brasilia : Parahiba (E. Gounelle).

Agelista (1) **andina** sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax opacus, obscure fusco-piceus, utrinque prope oculos niger, crasse albido-fulvoque pubescens. Pili ocularum flavidi. Clypeus fere glaber, dimidium oculorum mediorum saltem æquans. Abdomen longe oblongum, depressiusculum, supra atrum, vitta latissima sinuosa, postice pennata, albido-testacea ornatum, crebre et crasse albido-pilosum fere squamulatum. Chelæ longæ et angustæ, nigro-æneæ, coriaceæ et leviter transversim rugatæ, margine inferiore sulci dentibus trinis contiguis armato. Partes oris, sternum coxæque 1^{i} paris fusco-picea. Pedes lutei, valde nigricanti-annulati, femoribus 1^{i} paris nigris. Pedes 1^{i} paris reliquis longiores, tibiis subtus, in parte basali, aculeis binis, in parte apicali aculeis biseriatis 5-3 armatis, metatarsis tenuibus tibiis non multo brevioribus, aculeis brevibus 2-2 vel 3-3 subtus armatis. Pedes-maxillares fusco-picei nigro-setosi ; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi brevi, conica, subtus ad basin ampliata et cariniformi, armata; tarso late ovato apice attenuato; bulbo sat parvo, subrotundo, stylo libero maximo, circulos duos integros formante, omnino circumdato. — Resp. Arg. : Salta.

Lapsias (2) **estebanensis** sp. nov. — ♂. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, maculis ocularibus nigris latis notatus, parce et crasse flavido-pubescens, parte thoracica vitta media sat angusta et antice acuta luteo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, supra flavidi, intus et subtus albi. Clypeus dimidio oculorum mediorum latior, fere glaber, ad marginem setis paucis uniseriatis munitus. Abdomen oblongum, obscure fulvum, albido luteoque pubescens, vitta media, antice obscuriore rufulo-pilosa et

(1) **Agelista** nov. gen. A *Titanatto* imprimis differt clypeo oculis anticis duplo augustiore et pedibus posticis valde et numerose aculeatis. — Typus *A. andina*, E. Sim.

(2) **Lapsias** nov. gen. A *Charippo* Thorell differt chelarum margine superiore tridentato, patellis cunctis aculeatis, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus lateralibusque plurimis instructis. — Typus *L. estebanensis* E. Sim.

nigro-marginata, postice dilutiore, ampliata et arcubus fuscis tenuibus et angulosis segmentata, ornatum, subtus in medio inordinate fusco-punctatum et maculatum. Sternum luteum nitidum. Chelæ fulvæ, nitidæ, ad basin et extus valde convexæ, intus late depressæ, apice attenuatæ et divaricatæ, marginibus sulci longis, superiore dentibus remotis sed inter se subcontiguis trinis, medio alteris majore, inferiore dentibus subcontiguis binis, 1° majore valde compresso et arcuato, ungue simplici, valido et longo. Pedes lutei, metatarsis posticis confuse fusco-annulatis. Pedes-maxillares fulvi, femore (apice excepto) dilutiore, parce nigro-ciliati; patella circiter duplo longiore quam latiore; tibia patella æquilonga, teretiuscula, supra ad apicem ad angulum exteriorem incisura profunda et angusta, nigro-marginata, carinulam parvam et acutam includente notata; tarso sat longe ovato et acuto, extus ad basin crasse marginato et anguloso; bulbo magno, ovato, simplici. — Venezuela : San Esteban!

L. ciliatus sp. nov. — ♂. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax lævis, laete fulvo-rufescens, parte cephalica utrinque late nigro-marginata et fulvo-aurantiaco-pilosa. Pili oculorum supra flavidi subtus albidi. Clypeus fere nudus, setis longis paucissimis munitus. Abdomen fulvo-testaceum, utrinque parce fusco-punctatum et in parte apicali arcubus pallide fuscis valde arcuato-angulosis ornatum, albido-pilosum. Sternum, partes oris chelæque fulvo-rufescentia, glabra et nitida. Chelæ magnæ, antice et extus valde convexæ, subgeniculatæ et divaricatæ, marginibus sulci longis, dentibus remotis, superiore dentibus trinis subcontiguis, medio majore, inferiore dentibus binis, 2° 1° majore. Pedes fulvi, femoribus tibiisque 1i paris leviter obscurioribus et rufulo-tinctis, tibiis subtus crebre nigro-ciliatis, aculeis, ut in præcedenti ordinatis, armati. Pedes-maxillares fulvo-rufuli nigro-ciliati; tibia longiore quam latiore, patella circiter æquilonga vix angustiore, tereti et mutica; tarso longe ovato, longe attenuato, extus ad basin crasse marginato; bulbo ovato, apice oblique truncato et stylo valido et uncato armato. — Venezuela : Colonia Tovar!

L. cyrboides sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax lævis, parte cephalica nigra, thoracica fulvo-rufula vittis duabus latis fuscis confusis notata, parce fulvo-pilosus. Pili oculorum supra flavidi subtus albi. Clypeus angustus fere nudus. Abdomen oblongum, atrum, supra in medio late dilutius et testaceum, lineolis 4-5 fuscis, valde arcuato-angulosis, ornatum, flavido-pubescens. Chelæ fusco-olivaceæ, læves, parallelæ, margine sulci inferiore dentibus binis æquis armato. Sternum pedesque fusco-olivacea, coxis posticis tarsisque cunctis dilutioribus. Pedes 1i paris patellis muticis, tibiis subtus

aculeis longis gracilibus 3-3 aculeoque laterali interiore subapicali, munitis, metatarsis aculeis inferioribus longis 2-2 aculeoque laterali simili submedio utrinque munitis. Pedes-maxillares fusco-olivacei; tibia patella paulo breviore et paulo latiore, extus ad apicem fere supra apophysi oblique divaricata, haud attenuata et truncata, et subtus processu obtusissimo et emarginato armata; tarso longe ovato, convexo; bulbo ovato, apice oblique truncato cum angulo interiore stylo gracili et incurvo munito.

♀ A mari differt sterno pedibusque fulvo-rufescentibus, tibiis anticis aculeo laterali carentibus. — Plaga genitalis magna, ciliata, longior quam latior, antice angusta, subacuminata et foveolata, postice ampliata, obtusa et plagulam nigram includens. — Venezuela : Colonia Tovar!

Scopocira (1) **dentichelis** sp. nov. — ♂. Long. 3,7 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, fulvo-rufescens, parce et longe flavo-pubescens, linea marginali exili maculisque ocularibus parvis nigris notatus. Pili oculorum pallide flavi. Clypeus glaber. Abdomen angustum et longum, obscure testaceum, parce flavo-pilosum, pone medium macula magna ovata vel obtuse triquetra et prope apicem utrinque macula magna rotunda nigris, supra notatum. Sternum, partes oris pedesque pallide lutea, pedes antici reliquis multo longiores, paulo robustiores, rufescenti-tincti, tibiis metatarsisque utrinque fusco-lineatis, pedes 4^{i} paris, femoribus exceptis, fusco-lineatis. Tibia 1^{i} paris aculeis inferioribus 4-4 (basilaribus reliquis remotioribus), tibia 2^{i} paris aculeis debilioribus 3-3, metatarsi quatuor antici aculeis 2-2, armati. Chelæ fulvæ, læves, robustæ, compressæ et oblique proclives, supra ad picem, prope radicem unguis, dente valido et acuto, intus, in parte apicali, validissime lobato-dentatæ : dente maximo apice leviter crenulato, dein dentibus parvis 3-4 armatæ, ungue longissimo, prope medium valde curvato subplicato. Pedes-maxillares fulvi; femore gracili curvato; patella plus 1/3 longiore quam latiore parallela; tibia patella breviore et paulo angustiore, extus ad apicem apophysi recta simplici obtusa et antice directa munita; tarso tibia cum patella paulo longiore, tereti et leviter curvato, ad basin paululum convexo, bulbo multo superante; bulbo sat magno, ovato, disciformi.

♀. Long. 3 mill. Cephalothorax obscurior, longe albido-pubescens, parte thoracica vittis radiantibus trinis notata. Pili oculorum et clypei creberrimi, nivei. Abdomen supra latius nigro-notatum, in parte basali vittis longitudinalibus binis arcuatis, in parte altera

(1) **Scopocira** nov. gen. Ab *Astia* imprimis differt cephalothoracis parte thoracica fere abrupte declivi stria carente. Tibiis anticis aculeis 4-4 subtus instructis. Typus *S. dentichelis* E. S.

lineis transversis binis, 1ª in medio valde dentata, et postice maculis minoribus binis niveo-pilosis decoratum, subtus cinereo-testaceum subglabrum, vitta niveo-pilosa marginatum. Pedes-maxillares pedesque pallide lutei, tibiis metatarsisque anticis utrinque olivaceo-lineatis. Chelæ breves et verticales, margine inferiore sulci dentibus trinis, 1 paulo majore, instructo. Plaga genitalis ovata, fulvo-nitida, late et profunde sulcata. — Venezuela : Orinoco.

S. tenella sp. nov. — ♀. Long. 3,5. mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, fulvo-rufescens, maculis ocularibus lineaque marginali nigris notatus, parte cephalica maculis binis fuscis confusis notata. Pili oculorum pauci, pallide flavi. Clypeus glaber. Abdomen angustum, cephalothorace angustius et vix longius, albo-testaceum, parce et longe albo-pilosum, vitta longitudinali lata, apicem haud attingente, vittis transversis binis latis, 1ª recta, altera arcuata, secta, nigricanti et parce albo-punctata, et prope mamillas utrinque macula nigricanti ornatum. Sternum, partes oris, chelæ pedesque pallide lutea, femoribus tibiis metatarsisque utrinque nigro cinereove lineatis. Pedes-maxillares albo-testacei niveo-pilosi. Plaga genitalis plana, rufula, obtuse trapeziformis, antice attenuata et obtusissime bilobata, in parte altera longitudinaliter sulcata. — Brasilia : prov. Bahia : Rio Salobro (E. Gounelle).

S. histrio sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax nigropiceus, subtiliter coriaceus et opacus, parce fulvo-pubescens, parte cephalica vitta transversa latissima, parte thoracica antice vitta angustiore recurva, parce et longe albo-pilosis, ornatis. Pili oculorum breves, supra fulvi subtus albidi. Clypeus angustus et glaber. Abdomen angustum et longum, nigrum, supra vittis binis parallelis punctoque apicali niveo-pilosis decoratum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Chelæ leviter divaricatæ, supra, ad apicem ad angulum interiorem, apophysi incurva gracili sed obtusa armatæ, subtus, extus prope apicem, convexæ et mucronatæ, margine inferiore sulci dente subbasilari longo, recto, apice minutissime bifido instructo, ungue robusto et longo, supra ad basin anguloso, prope medio valde curvato subplicato. Pedes longi et graciles, antici nigricantes, tibiis metatarsisque dilutioribus sed utrinque fusco-vittatis, reliqui pedes lutei, patellis tibiis metatarsisque 4ⁱ paris utrinque nigricanti-lineatis. Pedes-maxillares nigricantes; tibia patella breviore, apophysi exteriore crassa obtusissima et cariniformi apophysique superiore longiore obliqua et profunde fissa, insigniter armata; tarso longo, supra in medio leviter depresso; bulbo ovato, apophysi nigra longa, apice furcata, munito. — Brasilia : le Para (de Mathan).

Gypogyna (1) **forceps** sp. nov. — ♂. Long. 4,6 mill. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, flavo-rufescens, pallide flavo-pubescens, parte cephalica dilutiore sed utrinque maculis ocularibus nigris notata, thoracica linea marginali lineaque media exillimis nigris ornata. Pili oculorum pauci flavidi. Abdomen breviter ovatum, albidum, lineis longitudinalibus olivaceis binis, postice sensim divaricatis atque in parte apicali maculis nigris binis obliquis supra ornatum. Sternum, partes oris chelæque flavo-rufescentia. Chelæ læves, nitidæ, cephalothorace vix breviores, fere directæ, crassæ et teretiusculæ, marginibus prope apicem dentibus longissimis et divaricatis, superiore gracili et acutissimo, inferiore multo crassiore obtuso et piloso armatis, ungue longissimo valde flexuoso. Pedes lutei, subpellucentes, antici rufulo-tincti, atque intus purpureo-vittati, patellis tibiisque 1i et 4i parium extus tenuiter purpureo-lineatis. Pedes-maxillares chelis breviores, fulvi, apice femoris patellaque intus purpureo-notatis; femore leviter curvato et compresso; patella paulo longiore quam latiore, parallela; tibia patella breviore, apice oblique secta, extus ad apicem alta, late emarginata atque apophysi superiore rufula parva et uncata munita; tarso magno, ovato et acuminato; bulbo disciformi, rufulo, stylo nigro circumdato.

♀ (pullus). Long. 4 mill. A mari differt chelis brevibus, margine inferiore sulci dentibus trinis munito. — Paraguay (Germain).

Rogmocrypta (2) **nigella** sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax opacus, parte cephalica nigra, parce fulvo-rufulo pilosa, thoracica fusca, vitta media paulo dilutiore et albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci albidi. Clypeus angustus, reclinatus glaber, sed in medio setis validis binis munitus. Abdomen nigrum, albido cinereo-pubescens. Chelæ fuscæ. Sternum nigricans, læve. Pedes antici fusco-olivacei, apice paulo dilutiores, tibiis 1i paris aculeis longissimis 3-3 metatarsis aculeis 3-3 subtus armatis. Pedes postici obscure fulvi, femoribus infuscatis, tibiis metatarsisque fusco vel nigricanti-annulatis. — Ins. Philippinæ : Antipolo!

R. puta sp. nov. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax lævis, tenuiter et parce flavido-pilosus, fulvo-rufescens, parte cephalica nigra. Pili oculorum pauci albi. Clypeus glaber, angustus, valde

(1) **Gypogyna** nov. gen. A *Scopocira* differt parte thoracica sensim declivi, antice paululum depressa et stria brevissima munita, tibiis anticis aculeis 2-2 subtus instructis. — Typus *G. forceps* E. Sim.

(1) **Rogmocrypta** nov. gen. A *Scopocira* imprimis differt oculis parvis ser. 2æ in medio vel paulo pone medium inter oculos laterales anticos et posticos sitis et tibiis 2i paris aculeis trinis uniseriatis subtus armatis. — Typus *R.* (*Chalcoscyrtus*) *elegans* E. Simon.

retro-obliquus. Abdomen oblongum, nitidum, subglabrum, fusco-lividum, subtus dilutius. Chelæ, sternum pedesque fulvo-rufescentia, tibiis metatarsisque anticis leviter infuscatis; tibiis 1i paris aculeis 3-3, metatarsis aculeis 2-2 subtus armatis. Area genitalis magna, plana et simplex, fere semicircularis, fulvo-nitida in medio fusca. — Singapore!

Stenodina (1) **tenuilineata** sp. nov. — ♂ (pullus). Long. 4 mill. — Cephalothorax pallide luteus, linea marginali exillima nigra lineisque dorsalibus trinis exilibus, media antice abbreviata, supra notatus, parce albido-pilosus, parte cephalica antice et utrinque crebrius luteo-pubescenti. Pili oculorum supra lutei, subtus albidi. Abdomen pallide luteum, lineis exillimis fuscis quatuor supra ornatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lutea, tibia antica insigniter longa, longe ovata, subtus, in parte apicali, aculeis robustis et brevibus 3-3 armata, metatarso brevi, subtus aculeis parvis 2-2 munito. — Australia : Cook-Town.

Tomocyrba (2) **decollata** sp. nov. — ♂. Long. 5-6 mill. — Cephalothorax altus, postice valde declivis, parte cephalica thoracica paulo longiore, valde inæquali et utrinque profunde depresso-excisa, fusco-rufescens, antice maculis ocularibus nigris latis, postice vitta media et utrinque vitta laterali lata dilutioribus notatus sed linea marginali exillima nigra cinctus, lævis et fere glaber, parce et longe flavido-pilosus et linea media exili et abbreviata albo-pilosa notatus. Oculi antici maximi et inter se contigui, pilis brevibus, extus flavidis intus albis, cincti. Clypeus latissimus, leviter depressus, nudus. Abdomen angustum, postice acuminatum, fusco-testaceum, vitta media lata dilutiore notatum, fere glabrum sed supra lineis binis leviter sinuosis albo-pilosis decoratum. Chelæ sat longæ et latæ, antice deplanatæ et extus tenuiter carinatæ, fuscæ, subtiliter coriaceæ. Partes oris sternumque fusco-olivacea. Pedes fulvi, antici, præsertim metatarsis, obscuriores sed patellis tibiisque supra ad apicem minute albo-pilosis. Pedes 1i paris patella insigniter longa, tibia aculeis 2-2, metatarso prope basin aculeis longioribus binis subtus armatis. Pedes maxillares pallide lutei, albo-pilosi, longi et graciles; femore curvato; patella plus triplo longiore quam latiore; tibia patella fere æquilonga vix graciliore, apophysi parva depressa obtusissima et subpellucente extus ad apicem

(1) **Stenodina** nov. gen. A *Mantisatta* Warburton, præsertim differt abdomine postice leviter prominulo sed obtusissimo. —Typus *S. tenuilineata* E. S.

(2) **Tomocyrba** nov. gen. Ab *Astia* imprimis differt parte cephalica longiore utrinque profunde et acute emarginata, oculis parvis ser. 2æ prope laterales anticos et intus sitis, tibiis quatuor anticis aculeis 2-2, metatarsis aculeis longioribus subbasilaribus binis subtus tantum armatis. — Typus *T. decollata* E. Sim.

armata; tarso anguste ovato, tibia vix longiore et vix latiore; bulbo simplici, ovato, stylo parvo apicali recurvo munito. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

T. barbata sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — A præcedenti differt cephalothorace obscuriore, parte cephalica parcissime luteo-pilosa, thoracica vitta media paulo dilutiore et luteo-pilosa ornata, clypeo paulo angustiore, sub oculis vitta transversa lata crasse albido-pilosa ornato, abdomine atro, parce albo-piloso, pedibus anticis nigricantibus, metatarsis ad basin dilutioribus, tarsis luteis, pedibus posticis fulvis valde fusco-annulatis, pedibus-maxillaribus paulo brevioribus, apophysi tibiali minutissima et subacuta, bulbi stylo apicali crassiore, subrecto atque obtuso. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

Cyrba nigrimanus sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax læte fulvo-rufescens, parte cephalica infuscata, utrinque prope oculos late nigra, omnino fulvo-aurantiaco pubescens. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei flavidi, crassi et densi. Abdomen nigricans, supra obscure et confuse testaceo-punctatum, longe et crebre cinereo-albido-pubescens, subtus utrinque linea exili flavido-pilosa marginatum. Chelæ fulvo-rufulæ, læves, margine superiore sulci dentibus trinis, 1° majore, inferiore dentibus trinis parvis æquis armatis. Sternum pedesque fulvo-rufula, parce aurantiaco pilosa, tibiis 1i paris nigricantibus metatarsis fuscis, aculeis ut in *C. algerina* ordinatis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, tibia tarsoque nigris, patella albo-pilosa. Plaga genitalis magna, rufula, latior quam longior, semicircularis, utrinque foveola obliqua, in medio plagula læviore cordiformi, munita. — Transvaal : Pretoria! Makapan!

Cotinusa (1) **bisetosa** sp. nov. — ♀. Long. 9,5 mill. — Cephalothorax subtilissime coriaceus nitidus, parcissime albo-pilosus, fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris maculisque medianis latis binis fuscis nigrisve ornata, parte thoracica linea marginali vittisque dorsalibus binis latis, postice sensim convergentibus, fusco-rufescentibus notata. Pili oculorum et clypei nivei. Abdomen longum et teretiusculum, albido-testaceum, albo-pubescens, in dimidio basali vittis longitudinalibus binis latis et subcontiguis, in parte altera maculis magnis subquadratis uniseriatis, in lateribus linea longitudinali, postice sæpe evanescenti nigricantibus ornatum, mamillis fulvis, supra leviter infuscatis. Chelæ fulvæ nitidæ, margine superiore sulci dentibus quatuor,

(1) **Cotinusa** = *Sadala* G. et E. Peckham, 1888, nomen præoccupatum (*Sadala* E. Simon, Arachn., 1880).

3° angulari, reliquis majore, margine inferiore dentibus binis subcontiguis 2° 1° duplo majore armatis. Sternum pedesque lutea, pedes 1i paris reliquis robustiores, tibiis aculeis apicalibus parvis binis minutissimis atque ante medium setis bulbosis binis subtus munitis — Venezuela : Caracas! Colonia Tovar!

C. vittata sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, versus marginem sensim infuscatus, parte cephalica dilutiore albido-opaca sed utrinque maculis ocularibus nigris notata, parte thoracica vitta media dilutiore ornata, parce fulvo-pilosus, pilis albidis, vittam mediam thoracicam et utrinque vittas laterales designantibus ornatus. Pili oculorum pauci, sordide albidi. Clypeus angustus, ad marginem vitta niveo-barbata ornatus. Abdomen angustum et longum, obscure fulvum, supra late et confuse fusco-bivittatum, utrinque linea albo-pilosa marginatum, in parte apicali maculis uniseriatis niveo-pilosis quatuor, 1a longitudinali, reliquis transversim triquetris, atque ad apicem utrinque puncto niveo decoratum, subtus fulvo-testaceum, mamillæ fulvæ. Chelæ valde attenuatæ et divaricatæ, leviter coriaceæ sed nitidæ, æneæ, versus apicem rufescenti-tinctæ. Partes oris, sternum, pedesque sex posteriores lutea, pedes 1i paris, præsertim femoribus, subtus et tibiis in lateribus valde infuscatis, sed metatarsis tarsisque luteis. Pedes-maxillares fulvi, femore infuscato et curvato; tibia patella breviore, apophysibus binis : superiore fulva, longa, gracili et recta sed apice leviter incrassata et intus oblique plicata, inferiore nigra gracillima, apice uncata, extus ad apicem instructa; tarso ovato; bulbo magno, convexo, apice stylo libero brevi et subrecto munito.

♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, maculis ocularibus nigris notatus, vittis duabus latis fusco-rufescentibus vittaque media dilutiore flavida, antice latissima, postice sensim acuminata, notatus. Pili oculorum et clypei nivei. Abdomen longum, albo-testaceum, utrinque parce et minute fusco-punctatum, supra vitta fusca, in parte basali lineam longitudinalem, in parte altera maculas triquetras tres includente, ornatum. Chelæ rufulæ, extus infuscatæ. Partes oris, sternum pedesque luteo-rufescentia. Area vulvæ rufula, fovea magna subrotunda nigro-biimpressa notata. — Brasilia : Tijuca prope Rio; Caraça (E. Gounelle).

C. septempunctata sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax niger, vitta media obscure rufa vel lutea, in parte cephalica latissima in thoracica angustiore et sensim attenuata notatus, parce fulvo-pilosus et antice utrinque sub oculis linea exili obliqua longe albo-pilosa ornatus. Pili oculorum pauci fulvi. Clypeus angustus glaber. Abdomen angustum, supra scuto nigerrimo nitido et

glabro obtectum, utrinque anguste albo-marginatum, prope apicem maculis transversis binis maculaque apicali minore albo-opacis et niveo-pilosis decoratum, subtus atrum. Chelæ nigræ, latæ, antice planæ, leviter depressæ et coriaceo-opaceæ. Sternum fulvum, apice sæpe infuscatum. Pedes quatuor antici nigri vel fusco-olivacei, tarsis 1[i] paris, coxis metatarsis tarsisque 2[i] paris luteis, pedes quatuor postici lutei, femoribus infuscatis nigrisve. Pedes-maxillares nigricantes tarso dilutiore; tibia patella breviore, apophysibus tenuibus binis, superiore fulva recta, inferiore rufula et curvata, extus armata.

♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax fulvus, vittis duabus, rufescentibus, postice convergentibus, notatus, parte cephalica albido-opaca, maculis ocularibus nigris et sæpe maculis mediis binis umbrosis ornata. Pili oculorum et clypei crassi nivei. Abdomen longum, albidum, albo-pubescens, utrinque parcissime et minute fusco-punctatum, supra in parte basali maculis quatuor per paria ordinatis, anticis alteris minoribus, in parte apicali maculis trinis uniseriatis, duabus anticis magnis semicircularibus, ultima parva et transversa, nigerrimis ornatum. Chelæ, sternum, pedesque fulvo-rufescentia. Plaga genitalis præcedentis. — Venezuela : Caracas! Colonia Tovar! San Esteban!

C. puella sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax leviter ovatus, subtilissime coriaceus et nitidus, parcissime albo-pilosus, luteo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus parvis nigris notata, parte thoracica lineis exilibus fuscis binis, oculos attingentibus sed postice sensim convergentibus ornata. Pili oculorum et clypei nivei. Abdomen longum et teretiusculum, albo-testaceum, antice lineolis binis longitudinalibus fuscis abbreviatis, paulo pone medium macula ovato-transversa, postice vitta transversa latiore nigerrimis supra ornatum, mamillis testaceis. Chelæ, partes oris sternumque fulvo-rufula, chelarum margine inferiore minute tridentato. Pedes lutei, antici reliquis robustiores, tibia subtus aculeis minutissimis apicalibus binis munita sed setis bulbosis carente. — Regio Amazonica : Teffe vel Ega (de Mathan).

C. dimidiata sp. nov. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax longus et parallelus, subtilissime coriaceus et nitidus, parcissime albo-pilosus, fulvo-rufescens, parte cephalica paulo obscuriore, maculis ocularibus nigris vittisque medianis binis nigricantibus notata, parte thoracica utrinque vittis fuscis radiantibus supra evanescentibus, versus marginem ampliatis, notata. Pili oculorum et clypei, in medio longi et decumbantes, nivei. Abdomen longum, teretiusculum, albo-testaceum, supra antice macula fusca magna triquetra, dein arcu nigro angusto et anguloso, postice vitta trans-

versa latissima nigra supra læte decoratum, subtus albidum, postice, prope mamillas, paululum infuscatum, mamillis superioribus nigris reliquis albidis. Chelæ, sternum pedesque flavo-rufula, femoribus 4[i] paris apice minute fusco-notatis. Pedes breves, antici reliquis robustiores, femore clavato, tibia aculeis apicalibus minutissimis binis armata sed setis bulbosis carente. — Regio Amazonica : Pebas, Iquitos, Fouteboa (de Mathan).

Thiodina (1) **vaccula** sp. nov. — ♂. Long. 5-6 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, parte cephalica subtilissime coriacea, rubro-castanea, prope oculos late nigra, utrinque inter oculos rubro alboque pilosa et postice macula media magna subquadrata albo-pilosa ornata, parte thoracica lævi, glabra, linea nigra, postice ampliata, cincta. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus angustus glaber. Abdomen angustum postice sensim acuminatum luteo-testaceum, supra minutissime et parce fusco-punctatum et lineis binis parallelis et integris albo-pilosis ornatum. Chelæ parallelæ, antice planæ, viridi-æneæ, nitidæ, transversim rugatæ, margine superiore sulci dentibus quatuor contiguis, inferiore dente minutissimo, munitis. Partes oris fuscæ testaceo-marginatæ. Sternum pedesque lutea, femoribus cunctis ad apicem late fusco-annulatis, patellis tibiis metatarsisque anticis præsertim in lateribus infuscatis et castaneis, parce albo-pilosis. Pedes-maxillares robusti et breves, lutei, longe sed parum dense albo-criniti; femore crasso curvato; patella paulo longiore quam latiore, parallela; tibia patella multo breviore, extus ad apicem apophysibus gracilibus binis, superiore longa tenui sed obtusa, antice directa et leviter curvata, inferiore paulo breviore infra directa, recta sed apice abrupte et valde uncata; tarso longe ovato; bulbo ad basin valde convexo et subgloboso, ad apicem attenuato sed obtuso, intus stylo gracili et subrecto munito. — Reg. Amazonica : Cameta (*Rio Tocantius*), Manaos, Fonteboa, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

T. Germaini sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — *T. vaccula* valde affinis. Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica subtilissime coriacea, rubro-castanea prope oculos late nigra, in medio albo utrinque aurantiaco-pilosa, parte thoracica subglabra, postice late nigricanti-marginata. Pili oculorum supra oculos flavi subtus cinereo-albidi. Clypeus angustus glaber. Abdomen angustum, postice acuminatum, luteo-testaceum, supra leviter infuscatum et lineis exilibus binis parallelis et integris albo-pilosis ornatum. Chelæ

(1) **Thiodina** nov. gen. A *Cotinusa* differt cephalothorace crasso, parte cephalica prope oculos convexa et utrinque depressa, pedibus 3[i] paris pedibus 4[i] paris non multo brevioribus, pedum posticorum patellis utrinque uniaculeatis, reliquis articulis parce aculeatis. — Typus T. (*Attus*) *elegans* Nicolet.

viridi-æneæ apice rufescentes, antice inæquales et rugatæ, intus carinatæ, marginibus sulci ut in *T. vaccula* sed inferiore interdum minute bidentato. Partes oris testaceæ ad basin infuscatæ. Sternum pedesque lutea, femoribus cunctis apice fusco-annulatis, patellis tibiis metatarsisque 1[i] paris infuscatis. Pedes-maxillares fere *T. vacculæ* sed apophysi tibiali superiore apice magis curvata, inferiore ad basin crassa, ad apicem gracillima styliformi, antice directa et valde curvata, S magnum fere formante. — Brasilia : Minas (E. Gounelle), Matto-Grosso (Germain). Paraguay (Germain).

Cynapes (1) **canosus** sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, arcu lato simpliciter albo-piloso ornatus. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus setis paucis uniseriatis ad marginem munitus. Abdomen nigro-nitidum, pilis pronis sordide albidis vestitum. Chelæ longæ, prope apicem angustiores et divaricatæ, nigro-æneæ, prope medium leviter depressæ et rugatæ, subtus, ad marginem interiorem, tuberculo submedio obtuso munitæ, margine sulci superiore prominulo, quadridentato, inferiore dentibus quatuor subcontiguis æquis armato. Partes oris sternumque nigra. Pedes antici robusti, fusco-castanei, femoribus fere nigris, tarsis luteis. Reliqui pedes lutei, metatarsis ad basin atque ad apicem anguste fuscis. Pedes-maxillares parvi et graciles, fusco-castanei parce albo-pilosi ; tibia patella breviore, extus ad apicem minute angulosa; tarso teretiusculo; bulbo anguste ovato ad basin subacute retro producto.

♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, parce albido-pilosus. Pili oculorum supra flavidi subtus albi. Clypeus parce albo-barbatus. Abdomen pallide fusco-testaceum, lineis valde angulosis vix expressis, breviter albo-pilosis, supra notatum, subtus atrum late testaceo-marginatum. Chelæ æneo-rufulæ, antice planæ et crebre coriaceo-granulosæ. Partes oris sternumque nigra. Pedes-maxillares pedesque flavidi. Plaga genitalis magna, rufula, latior quam longior, obtuse triquetra, antice minute foveolata. — Ins. Mauricia (Ch. Alluaud).

Padilla sartor sp. nov. — ♂. Long. 4,5 mill. — A. *P. armata* Peckh., cui valde affinis et subsimilis est, differt femoribus 1[i] paris intus aculeis dentiformibus binis armatis (in *P. armata* aculeo unico), apophysi chelarum longissima et antice directa, apicem versus attenuata et intus leviter et sensim incurva, nec angulosa

(1) **Cynapes** nov. gen. A *Bavia* differt patellis anticis intus uniaculeatis-tibiis aculeis inferioribus 3-3 multo longioribus armatis, pedum 4[i] paris trochanteribus coxis multo brevioribus, chelis subtus fere glabris, margine inferiore sulci dentibus multo validioribus 4 vel 5 armato. — Typus *C. (Salticus) Whrighti* Blackwall.

nec rugosa. Cephalothorax fusco-castaneus, prope marginem niger, vitta media lata et utrinque vitta submarginali albido-pilosis ornatus. Abdomen supra nigro-nitidum, fulvo-rufulo-pubescens, lineis binis albo vel luteo-pilosis biinterruptis supra ornatum. Pedes fusco-castanei, antici obscuriores fere nigri. — Madagascar : Tamatave (Camboué), Sainte-Marie (Mocq.).

P. lancearia sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica dilutiore flavido-opaca sed utrinque nigro-marginata et maculis binis obscurioribus vix expressis notata, utrinque pone oculos macula obliqua albo-squamulata ornatus. Pili oculorum pauci albidi. Clypeus vix ullus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, nitidum, antice lineis binis exilibus abbreviatis, in medio vitta transversa albo-squamulata supra ornatum. Chelæ breves, fulvæ, antice, prope basin, apophysi longissima, antice directa, gracillima sed obtusa et recta (apice haud uncata) luteo-pellucenti insigniter armatæ. Sternum pedesque sex posteriores lutea. Pedes 1[i] paris fusco-olivacei, tarso luteo, patella ad apicem crasse albo-squamulata, femore latissime clavato intus, ad marginem inferiorem aculeo erecto parvo subapicali armato, tibia latissima, ovato compressa, non multo longiore quam latiore, aculeis validis ordinariis armata et setis nigris longis et densis fimbriata. Pedes-maxillares breves, lutei, fere præcedentis sed apophysi tibiali breviore. — Nossi-Be.

P. mantis sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus et opacus, fovea thoracica minutissima punctiformi impressus, fusco-rufescens, utrinque fere niger, parte cephalica antice dilutiore et maculis nigris binis notata, utrinque vitta albo-squamulata marginata. Pili oculorum breves albidi. Clypeus vix ullus, nudus. Abdomen angustum et longum, supra duriusculum et nitidum, fusco-testaceum, antice lineis binis, postice maculis biseriatis nigris notatum, et maculis binis albo-squamulatis altera ad marginem anticum altera submedia ornatum. Chelæ breves, nigro-æneæ, antice planæ, et extus et intus acute carinatæ, atque intus leviter emarginatæ, haud contiguæ (apophysi anteriore carentes). Sternum fusco-testaceum læve. Pedes 1[i] paris castanei, tarso luteo, patella tibiaque ad basin albo-squamulatis, femore late clavato, intus ad marginem inferiorem aculeo erecto armato, tibia valde dilatata ovata et compressa, setis nigris et densis fimbriata, aculeis validis ordinariis armata. Pedes quatuor postici lutei, patellis tibiis metatarsisque apice tenuiter nigro-cinctis. Pedes-maxillares fulvi; patella haud longiore quam latiore; tibia patella breviore, latiore quam longiore, apophysi apicali gracili sat longa et subrecta extus armata; tarso longe ovato; bulbo magno, valde convexo, apice stylo, circulum formante, munito.

♀. Long. 4 mill. — Pallide lutea, parte cephalica flava et opaca utrinque maculis ocularibus nigris notata, thoracica vittis binis fuscis angustis et postice convergentibus notata, abdomine albido, antice lineis binis, prope medium maculis quatuor, per paria ordinatis, longis, anticis rectis, posticis uncatis maculisque apicalibus transversis trinis iniquis nigris decorato — Diego-Suarez (Ch. Alluaud).

P. glauca sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax sat brevis, regione thoracica cephalica vix longiore, cephalica parallela, atro-piceus sublævis, squamulis glauco-viridibus micantibus vestitus. Pili oculorum pauci flavidi. Clypeus angustus nudus. Abdomen breviter ovatum, postice acuminatum, atrum et longe cinereo-pilosum, antice arcubus binis, postice lineolis transversis binis rectis in medio interruptis punctoque apicali viridi-micanti-squamulatis supra decoratum. Chelæ breves, fusco-nitidæ, antice spina gracili recta et acutissima, fulva, antice directa et parte cephalica breviore, armatæ, margine sulci inferiore dentibus acutis longis quatuor armato. Partes oris sternumque fusco-picea. Pedes 1^{i} paris reliquis multo robustiores, lutei, tibia metatarsoque valde infuscatis sæpe nigris, femore late clavato, intus aculeis trinis, subtus aculeo erecto brevi sed paulo robustiore armato. Reliqui pedes lutei, femoribus supra tibiis metatarsisque ad basin infuscatis et subannulatis. Pedes-maxillares mediocres, obscure fulvi vel fusci; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi parva simplici et nigra armata; tarso sat longe ovato; bulbo ad basin convexo et producto. — Madagascar : Sinu Antongil (Mocquerys).

P. javana sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, fusco-testaceus, parte cephalica utrinque nigra, crebre et sat longe luteo-pubescenti, thoracica vitta media lata et utrinque linea exili luteo-pilosis notata. Pili oculorum supra lutei subtus albidi. Clypeus oculis mediis saltem triplo angustior fere nudus. Abdomen teretiusculum supra nigrum, sed vitta dilutiore parum expressa et postice dentata notatum, glabrum sed ad marginem anticum fasciculo albo ornatum, subtus vitta nigra lata albido-marginata munitum. Chelæ, partes oris sternumque fusco-olivacea. Chelæ breves, antice planæ, coriaceæ et extus nigro-marginatæ (apophysi carentes). Pedes 1^{i} paris robustissimi, castanei, femore tibiaque intus late nigris et cyaneo-tinctis, metatarso tarsoque luteis hoc apice rufulo. Reliqui pedes lutei subpellucentes. Femur 1^{i} paris aculeo parvo dentiformi et subapicali intus ad marginem interiorem, et extus, prope apicem, crista nigra, armatum. Pedes-maxillares parvi lutei; tibia apophysi apicali parva, simplici et acuta

armata; tarso ovato; bulbo ovato simplici sed stylo apicali, circulum formante, munito. — Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

Goleta Peckhami sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus fusco-rufescens, parte thoracica in medio dilutiore, glaber sed vitta media lata et integra crebre albo-pilosa subsquamulata ornatus. Pili oculorum pauci albidi. Abdomen longum postice sensim acuminatum, supra fuscum vitta lata dilutiore et crebre albo-pilosa ornatum, subtus luteum, mamillæ nigræ. Chelæ nigræ nitidæ. Sternum fulvum nitidum. Pedes 1^{i} paris robustissimi fulvi, femore supra patella tibiaque valde infuscatis, tibia longe ovata (femore paulo angustiore) aculeis robustis 3-3 subtus armata, metatarso brevi et subrecto aculeis longissimis pronis subtus armato. Reliqui pedes lutei, tibia 2^{i} paris aculeis tenuibus binis uniseriatis subtus munita. — Madagascar : Sainte-Marie (Mocquerys).

A *G. Workmanni* Peckham, imprimis differt vitta dorsali alba multo latiore, tibia antica minus inflata, metatarso antico recto haud sinuoso, aculeis longis et pronis nec dentiformibus nec erectis, subtus instructo.

Piranthus Casteti sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax supra lævis et nitidus sed versus marginem subtiliter coriaceus, fulvo-rufescens utrinque sensim infuscatus et maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica utrinque pallide flavido-pilosa. Pili oculorum et clypei crassi et albi. Abdomen angustum et longum, pallide fusco-testaceum, supra maculis nigricantibus magnis et subquadratis quatuor uniseriatis notatum. Chelæ, partes oris sternum pedesque sex posteriores fulvo-rufescentia. Pedes 1^{i} paris crassissimi, fusco-castanei, parce albo-pilosi, tarso luteo. — India : Trichinopoly (R. P. Castest).

Stenodeza (1) **acuminata** sp. nov.— ♀ (pullus). Long. 4 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, squamulis pallide micantibus subargenteis vestitus. Pili oculorum pauci albidi. Abdomen angustum et longissimum, antice rotundum, postice sensim acuminatum, supra nigrum et micanti-squamulatum, subtus luteum sed vitta obscuriore, antice evanescente et rimam haud attingente ornatum. Chelæ brevissimæ, oculis mediis maximis haud longiores sed convexæ, fusco-olivaceæ et nitidæ, ungue longo et rufulo, margine inferiore sulci dentibus 3 vel 4, 1° reliquis longiore

(1) Stenodeza nov. gen. — A *Pirantho* differt tibiis 1^{i} paris aculeis 4-4, tibiis 2^{i} paris aculeis debilibus binis uniseriatis subtus munitis; cephalothorace parallelo, vix latiore quam oculorum ser. 3^{æ}, oculis ser. 3^{æ} magnis, sterno antice acuminato. — Typus : *S. acuminata* E. Sim.

et obliquo, armato. Sternum nigro-nitidum. Pedes omnino pallide lutei, tibia 1[i] paris aculeis 4-4, medianis interioribus longioribus, metatarso aculeis 2-2, tibia 2[i] paris aculeis debilibus binis uniseriatis, metatarso aculeis parvis binis (altero exteriore subbasilari, altero interiore subapicali) subtus armatis. Pedes quatuor postici omnino mutici. Pedes-maxillares lutei, femore infuscato. — Reg. Amazonica : Teffe (de Mathan).

Astænorchestes (1) **frenatus** sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica antice, thoracica in medio dilutioribus et rufescentibus, pilis albis, ad marginem frontalem et utrinque sub oculis lineam exilem, in parte thoracica lineas abbreviatas et divaricatas designantibus, ornatus, parte cephalica impressionibus latis, leviter coriaceo-striolatis, munita. Pili oculorum pauci albidi. Clypeus glaber. Abdomen angustum (valde detritum), nigrum, vittis transversis albo-pilosis ornatum. Chelæ nigro-cupreæ, nitidæ, antice deplanatæ sed costa obliqua sectæ. Sternum fusco-rufescens. Pedes quatuor antici nigricantes, tarsis 1[i] paris, metatarsis tarsisque 2[i] paris luteis. Pedes postici femoribus patellisque nigricantibus, tibiis fuscis, reliquis articulis luteis sed metatarsis apice minute fuscis. Pedes-maxillares nigricantes, femore ad apicem albo-piloso; tibia patella breviore, apophysi bifida : ramulo superiore sat longo recto gracili sed obtuso, inferiore brevi et uncato, extus armata; tarso late ovato; bulbo maximo, ad basin valde convexo et in declivitate anteriore stylo, circulum formante, ornato. — Madagascar : Imerina (Camboué).

Massagris (2) **constricta** sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax nigro-piceus, parte cephalica, præsertim postice, dilutiore, coriaceus, parce et crasse flavo alboque pilosus. Pili oculorum pallide flavidi. Pili clypei longi albi. Abdomen depressiusculum, fusco-testaceum parce nigro-punctatum et utrinque nigro-striolatum, cervino-pubescens, vitta media, postice acuminata albido-pilosa supra ornatum, subtus atro-testaceum, regione epigasteris dilutiore. Sternum olivaceum. Partes oris fuscæ, intus late testaceo-limbatæ. Chelæ fuscæ et opacæ. Pedes antici nigri, coxis metatarsis tarsisque dilutioribus. Pedes postici olivacei, femoribus subnigris. Pedes-maxillares robusti et breves, nigri; patella convexa, paulo longiore quam latiore; tibia patella vix breviore,

(1) **Astænorchestes** nov. gen. — Ab *Hispone* differt quadrangulo oculorum haud longiore quam antice latiore, sternoque antice vix attenuato, late truncato haud depresso. — Typus *A. frenatus* E. S.

(2) **Massagris** nov. gen.— Ab *Hispone* differt cephalothoracis parte thoracica stria sat longa, oculos posticos fere attingente, munita, metatarsisque anticis aculeis parvis binis submediis subtus armatis. — Typus *M. constricta* E. S.

apophysi antice directa, recta, simplici, attenuata sed obtusa, articulo vix breviore, extus armata; tarso longe ovato, tibia et patella simul sumptis multo latiore et longiore; bulbo maximo, ad basin valde convexo, ad apicem lamina spirali, circulum formante, munito. — Prom. Bonæ Spei!

M. Martini sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris maculisque mediis fuscis binis latis, notata, subtiliter coriaceus, pilis simplicibus longis luteis vestitus. Pili oculorum lutei. Clypeus angustus, subglaber. Abdomen supra olivaceum et albido-pilosum, utrinque fusco-variatum, vitta media dilutiore, leviter pennata, ornatum, subtus nigricans, testaceo-marginatum. Chelæ nigricantes, opaceæ. Sternum olivaceum nitidum. Pedes lutei, femoribus, præsertim anticis infuscatis, tibiis metatarsisque confuse annulatis. Pedes-maxillares nigricantes; femore compresso et curvato; patella paulo longiore quam latiore, parallela; tibia patella breviore, apophysi longa, subrecta et antice directa extus armata; tarso longissimo teretiusculo, arcuato; bulbo magno, cordiformi. — Natal (Dr C. Martin).

Ballus segmentatus sp. nov. — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, nitidus sed coriaceus, albo-flavido pubescens. Pili oculorum supra pallide lutei subtus albi. Clypeus ad marginem setis albis longis uniseriatis ornatus. Abdomen latum, depressiusculum, antice late et recte sectum, supra nitidum sed duriusculum et subtiliter coriaceum, albo-luteo-pilosum, linea media exili arcubusque transversis, in medio angustis sed utrinque ampliatis, apicem versus sensim minoribus, nigricantibus, ornatum, subtus pallide testaceum, albo-pubescens, mamillis fuscis. Chelæ nigro-æneæ, antice leviter inæquales et intus emarginatæ. Partes oris sternumque nigricantia. Pedes 1i paris robustissimi, fusco-castanei, patella tarsoque dilutioribus. Reliqui pedes pallide lutei, femoribus 2i paris usque ad basin, reliquis ad apicem infuscatis. Pedes-maxillares sat graciles, fusci; tibia patella breviore, apophysi simplici acuta et recta, articulo paulo longiore extus armata; tarso sat angusto; bulbo ovato, stylo apicali, circulum formante, munito. — Ins. Taprobane : Colombo! Kandy!

B. sellatus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, crebre coriaceo-rugosus, pilis flavidis paucis, in parte cephalica maculas confusas, in thoracica lineas radiantes formantibus vestitus et linea marginali exili albo-pilosa cinctus. Pili oculorum flavidi. Clypeus valde reclinatus, nudus, sed in medio fasciculo pilorum flavidorum ornatus. Abdomen breve, antice fusco-olivaceum, utrinque confuse maculatum, postice dilutius et flavido-pubescens

sed macula magna subquadrata, linea transversa maculaque apicali nigris ornatum, subtus tenuiter cinereo-pubescens. Chelæ, partes oris sternumque fusco-olivacea. Chelarum margine inferiore dentibus gracilibus contiguis quatuor munito. Pedes 1^{i} paris robusti, femore late clavato, lutei, coxa femoreque obscurioribus hoc subtus et in lateribus nigricanti, tibia utrinque late nigricanti-maculata. Reliqui pedes pallide lutei subpellucentes, patella tibiaque 4^{i} paris apice minute fusco-notatis. Plaga genitalis magna, subquadrata, plana et rufula, fovea longitudinali, postice valde attenuata atque acuminata impressa. — Colombo!

Peplometus (1) **chlorophthalmus** sp. nov. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax niger, albo-luteo-pilosus, crebre et valde impresso-punctatus. Oculi antici smaragdinei. Pili oculorum et clypei albi, densi et longi. Abdomen cephalothorace multo longius, antice recte sectum, postice vix attenuatum atque obtusum, supra nigrum, duriusculum, creberrime impresso-punctatum et breviter albo-pilosum, subtus scuto magno trapezoidali nigro et punctato munitum. Sternum fuscum. Chelæ, partes oris coxæque olivaceæ. Pedes flavidi, tibiis 1^{i} paris nigerrimis, supra, prope marginem exteriorem, linea albo-pilosa ornatis, tibiis 2^{i} paris supra nigro-lineatis, posticis supra ad basin vix distincte fusco-lineatis, femoribus 3^{i} paris subtus infuscatis. Pedes 1^{i} paris crassissimi, tibia valde inflata, vix longiore quam altiore, extus et supra deplanata, intus excavata, superne visa ovata, ad marginem interiorem dilatato-rotunda ad exteriorem carinata et sulcata. Pedes-maxillares breves et robusti, flavo-rufuli, albo-pilosi. — Natal (Dr C. Martin).

Pachyballus (2) **transversus** sp. nov. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax fere duplo latior quam longior, postice recte truncatus, antice declivis, valde attenuatus atque obtusus, fere semicircularis, nigro-nitidus, crebre sed minutissime et regulariter punctatus. Pili oculorum et clypei breves albi. Abdomen magnum, clypeiforme, subrotundum sed antice latissime truncatum, supra convexum, ad marginem acute carinatum, nigro-nitidum, paulo grossius et creberrime impresso-punctatum, scuto ventrali castaneo valde punctato. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Pedes

(1) **Peplometus** nov. gen. A *Ballo* imprimis differt oculorum linea antica leviter procurva (non recurva), abdomine scuto dorsali scutoque ventrali munito, pedum 1^{i} paris patella superne convexa, tibia deplanata et angulosa subtus cristato-pilosa. — Typus P. (*Homalattus*) *biscutellatus* E. Sim.

(2) **Pachyballus** nov. gen. A. *Peplometo* differt cephalothorace fere duplo latiore quam longiore semicirculari, pedum 1^{i} paris patella tibia metatarsoque superne deplanatis, tibia patella paulo breviore subtus haud cristata. — Typus *P. transversus* E. Sim.

antici crassissimi, nigri tarso luteo, tibia patellaque circiter æquilongis et supra et utrinque deplanatis et angulosis. Reliqui pedes lutei, coxis femoribusque nigris. — Africa occid. (Congo), orient. (Zanzibar) et austro-orientalis.

P. castaneus sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — A præcedenti, cui valde affinis est, differt magnitudine majore, cephalothorace abdomineque rubro-castaneis grossius sed regulariter impresso-punctatis, pedibus fusco-castaneis, tarsis anticis, metatarsis tarsisque posticis luteis. — Natal (Dr C. Martin.)

Marengo chelifer sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, supra coriaceo-rugosus et fulvo-pubescens, utrinque parce et minute granulosus, ad marginem lineolis binis abbreviatis albo-pilosis ornatus. Oculi antici apicibus in lineam rectam. Abdomen ovatum, supra duriusculum et nitidissimum, nigrum violaceo-tinctum et antice utrinque puncto albo-piloso ornatum, subtus atrum. Chelæ breves, antice depressæ et inæquales, intus haud emarginatæ. Sternum fusco-castaneum, nitidum. Pedes 1i paris rufo-castanei, tarso parvo luteo, trochantere longo et cylindrato (sed coxa duplo breviore), femore longo, compresso supra leviter convexo, tibia late ovata, subtus nigro-cristata et utrinque in parte apicali triaculeata, metatarso gracili curvato, tibia non multo breviore et tarso plus triplo longiore, aculeis submediis binis parvis aculeisque binis apicalibus paulo majoribus armato. Pedes-maxillares parvi; tibia patella breviore, latiore quam longiore, extus ad apicem apophysi gracili et longa armata; tarso longe ovato; bulbo sat convexo, simplici sed apice stylo valido, circulum formante, munito. — Java : Buitenzorg.

M. striatipes sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax ovatus, postice valde attenuatus, sat convexus, parte thoracica declivi haud impressa, lævis sed utrinque parce granulosus, parce setosus, rufescens, antice ad frontem et postice ad marginem infuscatus, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra. Oculi antici apicibus in lineam leviter recurvam. Abdomen longe pediculatum sed sat late ovatum, nitidum et parce fulvo-setosum, fusco-testaceum, postice sensim obscurius, paulo ante medium linea transversa exili testacea et utrinque macula parva subrotunda niveo-pilosis ornatum, subtus luteo-testaceum, postice sensim infuscatum. Chelæ, partes oris sternumque fusco-olivacea nitida. Pedes 1i paris coxa trochantereque olivaceis, femore luteo supra anguste subtus late nigro-lineato, patella tibiaque rufo-castaneis, metatarso tarsoque luteis, femore sat gracili fere parallelo, tibia latissime ovata subtus sat breviter nigro-cristata et utrinque, in parte, apicali, aculeis robustis trinis armata, metatarso tibia breviore sed tarso multo lon-

giore, gracili, aculeis robustis sed brevibus 2-2 munito, reliqui pedes omnino mutici luteo-testacei, subpellucentes, sed intense nigro-lineati. Plaga genitalis plana, rufula, multo longior quam latior, antice areas duas ovatas et subcontiguas gerens. — Ins Taprobane : Colombo!

A *M. crassipedi* Peckham, differt imprimis cephalothorace convexo, femore 1^{i} paris fere parallelo haud clavato, tibia brevius cristata, tibia 2^{i} paris subtus mutica, picturaque abdominis.

M. nitida sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, prope oculos niger, crebre coriaceo-rugosus, sat longe sed parce fulvo-pilosus, parte thoracica utrinque, sub oculis posticis, vitta obliqua et postice macula parva longa et divaricata niveo-pilosis decorata. Oculi antici apicibus in lineam vix recurvam. Abdomen ovatum, supra duriusculum et nitidissimum, utrinque macula obliqua niveo-pilosa ornatum, subtus atrum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Chelæ breves intus emarginatæ. Pedes 1^{i} paris fusco-castanei, tibia nigro-nitida, metatarso dilutiore, tarso luteo, femore compresso late claviformi, tibia late ovata subtus longissime nigro-cristata et utrinque in parte apicali aculeis validis trinis armata, metatarso gracili tibia multo breviore sed tarso longiore, subtus aculeis validis 2-2 armato, reliqui pedes lutei, femoribus, præsertim posticis infuscatis et subvittatis, tibiis metatarsisque utrinque tenuiter nigricanti-lineatis, tibia 2^{i} paris subtus uniaculeata. Pedes-maxillares parvi fulvi, femore olivaceo; tibia patella breviore, latiore quam longiore, extus ad apicem apophysi parva simplici et acuta armata; tarso longe ovato; bulbo sat convexo, simplici sed apice stylo, circulum formante, munito. — Ins. Taprobane : Kandy!

M. coriacea sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, coriaceo-rugosus, parce fulvo-nitido-pilosus et utrinque ad marginem maculis parvis binis albo-cæruleo-pilosis ornatus. Pili oculorum pauci albi. Abdomen ovatum, supra nigerrimum, subtilissime coriaceum, antice parce et minute rugosum et prope medium late biimpressum, subtus atrum, utrinque macula parva albo-cæruleo-pilosa ornatum. Sternum nigrum, subtilissime coriaceum. Pedes 1^{i} paris nigri, femore patellaque supra rufescenti tinctis tarso luteo, femore late clavato supra parce granuloso et aculeo parvo submedio armato, tibia latissime ovata supra deplanata et leviter angulosa, subtus, inter aculeos, longissime sed inordinate fimbriata, metatarso brevi. Pedes sex posteriores lutei, coxis 3^{i} paris nigris, femoribus cunctis nigricantibus, patellis, tibiis metatarsisque nigro-lineatis. Pedes 2^{i} paris tibia aculeis binis uniseriatis, metatarso aculeo submedio minore subtus armatis. Pedes-maxillares breves, nigri, fere præcedentis. — Natal (Dr C. Martin).

Colaxes (1) **nitidiventris** sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax longus et humilis, valde coriaceo-rugosus, pilis longis pallide luteis, vittas confusas quatuor designantibus, vestitus. Pili oculorum pauci albidi. Abdomen angustum, teretiusculum, supra nigro-nitidum, sed antice vitta longitudinali et prope medium vitta transversa dilutioribus et albido-pilosis ornatum, subtus antice rufescens postice nigrum. Chelæ et partes oris nigræ. Sternum fulvo-rufescens. Pedes antici crassissimi fusco-castanei, coxis femoribus subtus tibiisque subnigris, femoribus late clavatis, tibiis late ovatis, subtus crista nigra longa ornatis, extus triaculeatis intus biaculeatis, pedes sex posteriores lutei, femoribus patellis tibiisque extus tenuiter nigro-lineatis, tibiis 2i paris aculeis binis uniseriatis subtus munitis. Pedes-maxillares parvi nigri; tibia patella breviore extus apophysi apicali simplici et acuta armata; tarso ovato et obtuso bulbum haud superante; bulbo ovato, apice truncato et stylo, circulum formante, munito. — India : Trichinopoly.

Philates (2) **grammicus** sp. nov. — ♂. Long. 2,1 mill. — Cephalothorax valde coriaceus et impresso-punctatus, niger, supra luteo-nitido versus marginem albido-pilosus, macula frontali parva, utrinque, pone oculos, vitta transversa lata et postice maculis minoribus binis longis et divaricatis crasse albo-luteo-pilosis ornatus. Pili oculorum pauci albi. Abdomen longum, in parte basali fusco-testaceum crebre et crasse luteo-pubescens, in parte apicali nigro-nitidum, glabrum sed macula apicali dilutiore et luteo-pilosa ornatum, subtus atro-testaceum, antice macula magna albo-pilosa ornatum, mamillis inferioribus testaceis, superioribus nigris. Chelæ fusco-rufulæ, margine inferiore sulci dentibus quatuor, 2° reliquis paulo majore, armato. Laminæ testaceæ. Pars labialis nigra, testaceo-marginata. Sternum nigrum, læve. Pedes 1i paris fusco-castanei, femore subtus nigro supra albo-piloso, patella tibiaque nigro-nitidis, tibia apice minute testacea et albo-pilosa, metatarso tarsoque luteis, femore latissime clavato, tibia late ovata, utrinque convexa, subtus longissime nigro-cinereo-fimbriata, in parte apicali intus aculeis brevibus binis, extus aculeis similibus trinis armata. Reliqui pedes lutei, femoribus 2i et 3i parium apice minute nigro-notatis, femoribus 4i paris late nigro-plagiatis. Pedes-maxillares parvi, fusco-castanei, tarso luteo et albo-piloso; tibia

(1) **Colaxes** nov. gen. A *Marengo* differt quadrangulo oculorum multo latiore quam longiore, tibiis 1i paris pilis densis inordinatis cristam formantibus, intus aculeis binis extus aculeis trinis, tibiis 2i paris aculeis binis uniseriatis subtus munitis. — Typus *C. nitidiventris* E. Sim.

(2) **Philates** nov. gen. A *Marengo* differt oculis anticis apicibus lineam leviter procurvam designantibus, cephalothorace supra plano, postice abrupte declivi, subverticali et leviter excavato. — Typus *P. grammicus* E. Sim.

brevi, apophysi simplici et acuta extus armata; tarso sat longo, bulbum superante; bulbo sat longe ovato, convexo, apice truncato et stylo tenui, circulum formante, munito.

♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax valde rugosus et punctatus, niger et nitidus, supra fulvo-nitido utrinque albido-pubescens. Abdomen ovatum, atro-testaceum, postice lineolis quatuor exilibus et postice convergentibus flavescenti-pilosis decoratum, subtus dilutius et concolor, mamillis inferioribus testaceis superioribus nigris. Pedes 1^{i} paris rufuli, femore tibiaque subtus late infuscatis fere nigris. Reliqui pedes lutei, femoribus cunctis tibiisque 4^{i} paris nigricanti-lineatis. Plaga vulvæ magna, rufula, plana, longior quam latior, antice rotunda postice sensim ampliata et truncata. — Ins. Philippinæ : Manila, Quingua, Antipolo!

P. inornatus sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, opacus, valde et crebre coriaceo-rugosus, pilis albis paucis conspersus sed ad marginem maculis confusis crebrius pilosis ornatus. Pili oculorum pauci albi. Abdomen oblongum, atrum, parce albo-pilosum. Pars labialis sternumque atra. Laminæ olivaceo-testaceæ. Pedes 1^{i} paris (præcedentis) nigri, metatarso tarsoque luteis. Reliqui pedes lutei, coxis olivaceis, femoribus nigricantibus, patellis tibiisque utrinque nigro-lineatis. Pedes-maxillares flavidi, femore nigro. Plaga genitalis magna, plana et rufula. — Ins. Taprobane : Kandy!

Haterius (1) **semitectus** sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax longus, parte cephalica coriacea, fusco-picea utrinque nigra sordide albido-pilosa sed antice posticeque vitta transversa albidius pilosa marginata, parte thoracica fulvo-rufula, parce albo-pilosa. Pili oculorum pauci albi. Clypeus subglaber. Abdomen teretiusculum, antice in medio albido postice cinereo-virescenti-pubescens, subtus nigrum, sed antice, pone rimam genitalem, albo-pilosum. Sternum nitidum, obscure fulvum, postice infuscatum. Pedes 1^{i} paris fulvo-rufescentes, coxis trochanteribus, metatarsis tarsisque fusco-olivaceis, tibiis latissime clavatis, subtus crista media nigra longissime pilosa et utrinque aculeis seriatis (extus 4, intus 3) armatis. Reliqui pedes lutei, tarsis exceptis, nigro-lineatis. Pedes-maxillares lutei. Plaga genitalis rufula, late et ovate biimpressa.

Var. Pars thoracica, sternum, femora, patellæ, tibiæque antica (apice excepto) nigra. — Australia : Cook-Town.

(1) **Haterius** nov. gen. A *Rhombonoto* L. Koch, differt oculis parvis ser. 2æ fere in medio inter oculos laterales anticos et posticos sitis, quadranguloque oculorum parte thoracica haud longiore. — Typus *H. semitectus* E. Sim.

Consingis (1) **semicana** sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, crebre coriaceo-rugosus, linea niveo-pilosa cinctus, parte cephalica utrinque in declivitate, parte thoracica antice parce et longe albo-pilosis. Pili oculorum et clypei albi. Abdomen cylindraceum, ante medium leviter transversim depressum, nigrum, nitidum et parce albo-pilosum. Chelæ sternumque nigra. Pedes nigri, tibia 1^{i} paris ad apicem metatarsoque rufescentibus, tarso luteo, coxa trochantere tibia metatarsoque ad basin 2^{i} paris luteis, tibia metatarsoque 3^{i} paris fulvo-rufulis sed utrinque nigricanti vittatis, trochantere patella tarsoque 4^{i} paris luteis. Pedes 1^{i} paris crassissimi, reliqui tenues. Pedes-maxillares parvi, nigri, tarso apice fulvo; tibia brevi, transversa, apophysi gracili et incurva extus armata; tarso angusto; bulbo simplici ad basin convexo. — Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

Salticus jugularis sp. nov. — ♂. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus et opacus, longe et parce albo-pilosus, parte cephalica subquadrata leviter convexa, thoracica cephalica circiter æquilonga et fere parallela, antice depressione transversa profundissima discreta, facie obtusa, utrinque, sub oculis lateralibus, anguloso-dilatata et auriformi. Oculi antici viridinitidi. Pidi oculorum et clypei longi densi et albi. Pediculum abdominale breve. Abdomen breviter ovatum, cephalothorace haud longius, nigrum, antice duriusculum et subglabrum, præterea crebre et longe albo-pubescens. Chelæ proclives, cephalothorace circiter æquilongæ, supra planæ, nigræ, subtiliter coriaceo-rugosæ et transversim rugatæ, extus usque ad apicem carinulatæ et in parte basali ovato-arcuatæ, ungue longissimo simplici. Pedes mediocres, nigri, parce albo-pilosi; pedes 1^{i} paris coxa femoreque in dimidio apicali luteis, patella tibiaque leviter depressis et supra et subtus fulvo-vittatis; pedes 2^{i} paris femore ad apicem anguste luteo-annulato, patella tibiaque late luteo-vittatis, metatarso tarsoque omnino luteis; pedes 3^{i} paris metatarso late luteo-vittato, tarso luteo; pedes 4^{i} paris coxa, patella ad basin et subtus tarsoque ad apicem luteis. Pedes antici aculeis parvis setiformibus paucissimis muniti. Partes oris sternum et pedes-maxillares nigra. Pedes-maxillares graciles; tibia patella saltem 1/3 longiore, apicem versus leviter et sensim ampliata mutica; tarso fere parallelo, depressiusculo ad apicem oblique truncato et subfoveolato; bulbo parvo disciformi, stylo libero longo omnino circumdato. — Australia : Cook-Town.

(1) **Consingis** nov. gen. *A. Peckhamia* (nov. genus, cujus typus est *Synemosyna scorpionea* Hentz) differt cephalothorace valde rhomboidali, superne plano, postice sat abrupte declivi et area aculorum dorsalium circiter æque longa ac postice lata. — Typus *C. semicana* E. Simon.

S. Eumenes sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger, in contractura media dilutior et rufescens, parte cephalica subquadrata fere lævi, thoracica subtiliter rugosa cephalica circiter æquilonga, angustiore, convexa et ovata, antice valde depressa et constricta. Pili oculorum pauci fulvi. Oculi antici inter se valde iniqui et contigui, in lineam rectam. Petiolum abdominale cephalothorace vix brevius, tenui, nigrum, supra bipartitum, segmento 1° longissimo, 2° brevi. Abdomen petiolo non multo longius, angustum et teretiusculum, ante medium constrictum, nigro-nitidum, utrinque et subtus albido-cingulatum. Chelæ cephalothorace breviores, proclives, fulvo-rufulæ, micanti-tinctæ, apicem versus leviter attenuatæ et intus dente apicali valido arcuato et antice directo munitæ, supra planæ et utrinque tenuiter carinatæ, ad marginem exteriorem dente submedio parvo, prope basin dente majore et erecto insigniter instructæ. Pedes sat breves graciles sed femoribus 1ⁱ paris et 4ⁱ paris ad basin dilatatis et compressis, pallide lutei; pedes 1ⁱ paris femore rufulo-tincto, metatarso, basi excepto, nigro; pedes 2ⁱ et 3ⁱ parium femoribus olivaceo-lineatis; pedes 4ⁱ paris coxa femoreque rufulis fusco variatis. Tibia 1ⁱ paris aculeis 5-5 metatarsus aculeis longioribus 2-2 subtus armati. Pedes-maxillares graciles fusco-rufuli; tibia patella paulo longiore et crassiore extus ad apicem apophysi brevi sed crassa et obtusa armata; tarso breviter ovato; bulbo disciformi, stylo tenui recurvo munito. — Nossi-Bé.

Panachraesta (1) **paludosa** sp. nov. — ♀. Long. 5-6 mill. — Cephalothorax sublævis, parce luteo-pubescens, parte cephalica pallide fulva, in medio confuse infuscata, utrinque, prope oculos, nigro-ænea, thoracica fulvo-rufula, versus marginem sensim infuscata. Pili oculorum supra lutei subtus albi. Abdomen longum, antice rotundum, fulvo-nitidum, nigricanti-marginatum, supra antice linea leviter lanceolata, dein lineolis obliquis biseriatis (5-5 vel 6-6), subtus vitta sat angusta, nigris, notatum. Chelæ rufulæ, ad basin æneo-tinctæ, antice deplanatæ et leviter coriaceæ. Partes oris sternumque fusca. Pedes-maxillares pedesque lutei, tibiis 1ⁱ paris extus ad basin leviter infuscatis. Area genitalis latior quam longior, utrinque fulva et depressa, in medio carinula fusca munita. — Colombo!

Emertonius rufescens sp. nov. — Long. 5 mill. — Cephalothorax longus, fere parallelus, humilis et supra planus, sed postice abrupte declivis, parte cephalica subtiliter coriacea, aurantiaca, in medio confuse obscuriore, utrinque maculis ocularibus nigris

(1) **Panachræsta** nov. gen. — Ab *Emertonio* differt parte thoracica postice longe declivi, antice, pone oculos, sulco minutissimo impressa.

notata, thoracica grossius coriacea castanea. Oculi antici pilis albis longis cincti. Abdomen angustum et longum, antice leviter prominulum, obtusum et emarginatum, postice sensim attenuatum, omnino luteo-testaceum. Chelæ rufo-castaneæ, breves et læves. Sternum pedesque lutea, patellis tibiisque anticis rufulo-tinctis. Pedes 1[i] paris tibia subtus leviter deplanata, aculeis longis et pronis (apicalibus minoribus), 5-5 armata, metatarso leviter curvato, tibia fere duplo breviore, aculeis 2-2 subtus munito. Pedes 2[i] paris tibia subtus aculeo parvo submedio, metatarso aculeis apicalibus minutissimis armatis. Pedes-maxillares pallide lutei. — Madagascar : Diego-Suarez (Ch. Alluaud).

Bocus flavus sp. nov. — ♂. Long. 6-7 mill. — Cephalothorax flavo-rufescens, parte cephalica leviter infuscata flavo-pilosa et maculis ocularibus nigris notata, parte thoracica utrinque vitta obliqua albo-pilosa ornata. Abdomen cylindraceum fusco-luteum nitidum. Sternum, chelæ, pedesque lutea, femoribus patellisque anticis utrinque fusco-lineatis, tibiis metatarsisque posticis, saltem ad basin, leviter infuscatis. Chelæ proclives, mediocres, parte cephalica haud longiores, supra planæ, leviter coriaceæ et extus carinulatæ, margine superiore sulci, prope apicem, dentibus binis (1° altero paulo majore), margine inferiore dentibus seriatis a sese æquidistantibus 7 parvis (basilaribus binis alteris paulo majoribus) armatis. Pedes-maxillares breves et robusti; tibia patella paulo longiore, apicem versus leviter ampliata, intus crinita, extus apophysi apicali parva et leviter uncata armata; tarso ovato; bulbo apicem tarsi fere attingente, ovato, plano, stylo circumdato. — Manila !

Fluda nigritarsis sp. nov. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, maculis ocularibus latis nigris notatus, subtiliter coriaceo-rugosus, parce et longe flavido-pilosus. Pili oculorum pallide flavidi, clypeus fere glaber. Abdomen longum, in medio valde constrictum, supra fusco-rufulum, nitidum, in medio testaceo-cingulatum, subtus testaceum sæpe postice infuscatum. Chelæ partes oris sternumque fusco-rufula. Pedes 1[i] paris femore fusco-rufulo interdum nigro, patella tibia tarsoque luteis, metatarso, apice excepto, nigro, femore latissime clavato, compresso et intus deplanato, nec granuloso nec fimbriato sed subtus usque ad apicem et supra, præsertim ad basin, tenuiter carinulato, patella mutica, tibia aculeis 5-4, metatarso aculeis longioribus 3-3 subtus armatis; reliqui pedes lutei, fusco-lineati. Pedes-maxillares fusco-rufuli vel nigri; femore robusto, subtus compresso et leviter dilatato; patella sat longa convexa; tibia multo breviore, extus ad apicem apophysi longissima (articulo plus duplo longiore) acuta,

antice directa et leviter arcuata armata; tarso longe ovato; bulbo disciformi convexo. — Venezuela : Caracas! San Esteban!

F. angulosa sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, maculis ocularibus latis nigris notatus, subtiliter coriaceo-rugosus, tenuiter et parce albido-pilosus. Pili oculorum albi. Clypeus sub oculis glaber ad marginem pilis albis seriatis munitus. Abdomen fere præcedentis supra fuscum, pubescens, in medio albido-cingulatum, subtus in medio late albido-testaceum, ad basin atque ad apicem infuscatum. Chelæ, partes oris sternumque fusco-rufescentia. Pedes 1i paris femore fusco-rufulo, utrinque, præsertim intus, late nigricanti, reliquis articulis fulvis vel luteis, patella tibia metatarsoque utrinque fusco-lineatis, femore latissime clavato compresso haud carinato, subtus, ad marginem interiorem granuloso ad exteriorem, saltem ad apicem, nigro-fimbriato, supra pilis longis, sed paucis nigris munito, reliquis articulis ut in præcedenti. Reliqui pedes lutei, femoribus tibiisque posticis leviter infuscatis. Pedes-maxillares nigricantes; femore robusto, subtus ad apicem ampliato et anguloso; patella sat longa, convexa; tibia multo breviore, extus ad apicem apophysi brevi acuta et leviter uncata munita; tarso bulboque præcendentis. — Venezuela : Caracas! Colonia Tovar! San Esteban!